

Beitrag zur Kasuistik des Myxofibroms.



INAUGURAL-DISSERTATION

zur

Erlangung der Doktorwürde

der Hohen Medizinischen Fakultät der
Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität
zu Bonn.



Vorgelegt am 16. Januar 1937.

von

Walter Heinen

aus Rheydt-Odenkirchen

Anton Brand, Bonn

Bonn 1937

Gedruckt
mit Genehmigung der medizinischen Fakultät
der Universität Bonn.

Referent: Prof. Dr. Graff
Korreferent: Prof. Dr. Freiherr von Redwitz



Meinen lieben Eltern!

Die Bezeichnung Myxom, Myxofibrom u. a. oder Schleimgewebsgeschwulst ist von Virchow in die Geschwulstlehre eingeführt. Vor ihm war es lediglich das an Schleim oder Gallerte erinnernde Aussehen, was zur Zusammenfassung in Ursprung und Struktur verschiedener Geschwülste, z. B. als Kolloid oder als Gallertgeschwulst, den Anlaß gab. Virchow stellte dagegen als physiologisches Vorbild für das Myxom, Myxofibrom u. a. das Schleimgewebe auf, wie es bei niederen Tieren sehr verbreitet ist, beim menschlichen Embryo reichlich vorkommt, wie es ferner in der Wharton'schen Sulze des Nabelstranges bekannt ist. Beim Erwachsenen erhält es sich normalerweise nur im Glaskörper.

Virchow hat aber zugleich zugestanden, daß es in reiner Form sehr selten sei und die verschiedensten Übergänge zum Bindegewebe sich fänden, daß in der Grundsubstanz fast immer Fibrillenzüge vorkämen, von einzelnen wenigen Fäden an bis zum dichten Netze, so daß die Unterscheidung vom Bindegewebe vermittelt des Mikroskopes unmöglich sei.

Somit betont Virchow, daß das Myxom gegenüber dem Myxofibrom nichts wesentlich besonderes ist. Das Myxofibrom ist eben ein stärker bindegewebig durchsetztes Myxom.

Nach Alchoff gibt es über die Entstehung des Myxofibroms zwei Theorien. Nach der einen heißt es, wenn aus Bindestanzgewebe echtes Schleimgewebe wird, liegt wohl stets kein einfach regressiver Vorgang zugrunde, sondern Neubildung mit Umdifferenzierung. So ist auch die „myxomatöse Umwandlung“ in Fibromen (Lipomen und Chondromen) zu verstehen. Nach der anderen heißt es, umgekehrt kommen in Myxomen auch fibromatöse (lipomatöse und chondromatöse) Umwandlungen vor. Solche Umwandlungen — Differenzierungen — werden besonders verständlich, wenn man die Myxome von Überresten embryonaler Bindestanz ableitet.

Ribbert spricht ebenfalls von zwei Möglichkeiten der Entstehung. Entweder ist irgendein voll entwickeltes Binde- oder Fettgewebe bei der Tumorbildung zu Schleimgewebe geworden und damit auf seine embryonale Vorstufe zurückgekehrt oder die Myxome gehen aus embryonalen Keimen hervor, die ihre mucinöse Eigenschaft behielten. Nach Ribbert kann diese zweite Möglichkeit nur allein ernstlich in Betracht kommen, und belegt so, daß wir außerhalb des Geschwulstgebietes keine Umwandlung fertiger Binde- substanz in typisches Schleimgewebe kennen und daher kein Recht haben, diese Metamorphose in den Tumoren anzunehmen. Geht man von einem embryonalen Keim aus, so erklären sich alle Beobachtungen über Myxome sehr gut und das Zusammentreffen mit jenen anderen Gewebearten läßt sich unter der Vorstellung leicht verstehen, daß eben eine partielle Weiterentwicklung des Keimes im Bindegewebe, oder Fettgewebe eintrat, während eine lebhaftere Wucherung der Zellen den Sarkomatösen Charakter mit sich bringen.

Das Myxofibrom sieht grauweiß und fulzig aus. Das Gewebe besteht aus spindel- oder sternförmigen oder anders gestalteten Zellen mit Ausläufern, die miteinander zusammenhängen; in den Maschen zwischen diesen Ausläufern findet sich der Schleim. Nekrose und Erweichung kommt mitunter in Beobachtung, was sich aus den wenigen Blutgefäßen versteht. Auf Entstehung aus einem embryonalen Keim scheint das relative häufige Vorkommen im Herzen hinzuweisen, weil das Endokard beim Embryo aus Schleimgewebe besteht, auch das Auftreten in Mischgeschwülsten.

Myxofibrome sind ja Schleimgewebsgeschwülste. Zum Nachweis pathologischen Schleimgewebes muß Schleim mikrochemisch festgestellt werden. Bei niedrigem Mucingehalt ist jedoch eine sichere Unterscheidung von morphologisch ödematösem Gewebe schwer. Wir müssen ferner unterscheiden Schleim, der vom Epithel gebildet und im benachbarten Bindegewebe angehäuft wird, wie beim Schleimkrebs, und Schleim, den wir im Bindegewebe antreffen, ohne daß wir Grund haben denselben als von Epithel gebildet zu betrachten. Hier müssen wir Metaplasie von Binde- in Schleimgewebe annehmen, ohne etwas näheres von der Schleimbildung angeben zu

können, wenn nicht die Geschwulst von einem embryonalen Schleimgewebe entstanden ist.

Die histologische Untersuchung der typischen, myxomatösen Partien läßt charakteristische, vielgestaltige, sternförmige, mit sehr langen Ausläufern versehene Zellen erkennen. Die Fortsätze sind schmal, gebogen und geknickt oder gerade verlaufend und vielfach gekreuzt.

Zwischen den Zellen und ihren Ausläufern befindet sich eine homogene transparente, in gehärteten Präparaten durch Gerinnung feinkörnige oder feinfädige Masse, durch die auch einzelne feinste Fibrillen und ein spärliches Blutgefäßnetz hindurchziehen.

Die Zellen enthalten gern feine, manchmal viele Fettröpfchen. Sie sind meist einkernig, zuweilen aber mehrkernig, auch ungewöhnlich groß und dann als Riesenzellen zu bezeichnen, die zuweilen sehr reichlich auftreten und meist besonders reich an dichtgedrängten Fettröpfchen sind. Sie erscheinen zum größten Teil ohne Fortsätze, sind abgerundet oder nur mit kurzen Ausläufern ausgestattet. Die Beziehung zu den fibrösen Teilen kommt darin zum Ausdruck, daß zwischen den Zellen immer mehr Fibrillen auftreten, während jene die Beschaffenheit gewöhnlicher Bindegewebeelemente annehmen und die schleimig flüssigen Zwischensubstanz zurücktritt.

Eine besondere Art von Fremdkörpern sind Schleimmassen, welche aus der Perforationsöffnung des Wurmfortsatzes bzw. eines Dünndarmventrikels, eines strikturierten Darmes beim Foetus oder aus geplatzten Ovarialgeschwülsten oder Resten des Ductus omphalomesentericus in die Bauchhöhle übertreten können und an Ort und Stelle oder nach Verreibung durch die Darmbewegung organisiert werden und so eine geschwulstähnliche Wucherung vortäuschen, Pseudomyxom des Peritoneums.

Es ist auch wichtig, auf die Ähnlichkeit des Myxofibroms mit dem ödematös durchtränkten Fibrom hinzuweisen. So kann eine starke ödematöse Durchtränkung des Fibroms eine schleimig-fulzige Konsistenz und gallertiges Aussehen der Geschwulst hervorrufen und so eine schleimige Umwandlung vortäuschen. Ebenfowenig darf man ödematös-gallertiges Knochenmark in sonst normalen

Knochen und in spongiösen Osteomen myxomatös nennen (Virchow).

Das Wachstum der Myxofibrome ist anfänglich und nicht selten dauernd expansiv. Sie sind dann durch eine Art bindegewebiger Kapsel abgegrenzt und ausschälbar. Manchmal aber dringen sie infiltrierend vor. Wo Myxom an fibrilläres Bindegewebe anstößt, dringt es in dessen Saftspalten hinein und erweitert sie. Man kann zuweilen auf große Entfernung einzelne Myxomstraßen in der Umgebung auffinden. Die Bindegewebefasern werden auseinandergedrängt, in Teile zerlegt und lösen sich schließlich auf.

Als echte embryonale fibromatöse Myxome sind die umschriebenen myxomatösen Wucherungsherde am Nabelstrang anzuführen, die von Ruych erwähnt werden. Bemerkenswert ist, daß auch wiederholt im späteren Leben solche in der Nabelgegend beobachtet wurden.

Im intermusculären Bindegewebe, sowie im subserösen Lager, namentlich des Peritoneums kommt ferner Entwicklung von Schleimgeschwülsten zur Beobachtung. Besondere Schwierigkeit für die operative Entfernung gewähren die von Langenbeck beschriebenen, vom epiperitonealen Bindegewebe ausgehenden Myxofibrome. Langenbeck untersuchte ein großes Myxofibrom des retroperitonealen Bindegewebes, welches fast das ganze Becken ausfüllte.

An den Knochen kommt ebenfalls das Myxofibrom vor, und zwar scheint es hier vorzugsweise vom Knochenmark seinen Ausgang zu nehmen; gerade hier sind übrigens Übergänge zu den weichen Chondromen beobachtet. Virchow hat besonders hervorgehoben, daß man die spongiösen Osteome mit schleimigem Mark nicht mit dem Myxofibrom dieser Teile verwechseln darf.

Von besonderer klinischer Bedeutung sind die Myxofibrome am zentralen und peripheren Nervenapparat. So hat man Myxofibrome am Porus acusticus beobachtet. Trautmann berichtet über einen Fall, in welchem zugleich mit mehreren Fibromen eine als Myxofibrom zu bezeichnende Neubildung, die mikroskopische Untersuchung zeigte Übergang von Schleimgewebe in Bindegewebe,

aus den Zellen des Warzenfortsatzes entspringend, die Corticalis des letzteren und des äußeren Gehörganges usuriert hatte und durch den Meatus acusticus extern. zutage getreten war. Der gemeinschaftliche Ursprung dieser Neubildungen, die Zellen des Warzenfortsatzes, hat kein Zylinderepithel und ziemlich straffes Bindegewebe und trotzdem fand Trautmann dieselben Verschiedenheiten, wie sie geschildert sind, sowohl in der Anordnung der Epithelien, wie des Bindegewebes.

Auch sah Virchow Myxofibrome an der Arachnoidea spinalis. Ferner kommen solche über dem Dorsalmark vor. Im letzten Fall gab die Geschwulst die Veranlassung heftiger, jahrelang bestehender Neuralgie. Auch am Ependym der Ventrikel oder von dem Gefäßplexus ausgehend, wurden Myxofibrome beobachtet. Hertz beschreibt ein hühnereigroßes Myxofibrom im rechten Seitenventrikel. Auch in der Hirnsubstanz selbst kommen Myxofibrome vor, besonders im Großhirn, gerade hier können sie durch ihre Weichheit, wie in einem Falle den Eindruck von Cysten machen. Bemerkenswert ist eine Beobachtung von Billroth, der eine diffuse myxomatöse Neubildung in den Gefäßcheiden der Kleinhirngefäße beschrieben hat. Billroth beobachtete einen ganz analogen Fall, in welchem die ganze rechte Kleinhirnhemisphäre in dieser Weise in eine gallertig durchscheinende Substanz verwandelt war.

Das Vorkommen des Myxofibroms an den Nerven ist ein verhältnismäßig häufiges und es ist hier von erheblicher klinischer Bedeutung, weil diese Geschwülste die Ursache sehr heftiger Neuralgien werden können und weil zudem ein multiples Vorkommen solcher Tumoren, sowohl in einem als in mehreren Nervenbezirken, nicht selten ist. Der Ausgangspunkt dieser Nerven-Myxofibrome ist das Nervenbindegewebe, das Perineurium, die Geschwulstmasse drängt die Nervenfasern auseinander und bildet zylindrische oder spindelförmige Anschwellungen; mitunter umgibt sie auch scheidenartig größere Nervenstrecken, wie z. B. in einem Falle von Coupland, wo die Nerven des Vorderarmes Sitz multipler Myxofibrombildung waren. Diese Myxofibrome des Nervenbindegewebes sind vielfach mit den Neuomen zusammengeworfen worden; doch

liegt es auf der Hand, daß mit diesem Namen nur solche Geschwülste zu belegen sind, welche wirklich aus Nervengewebe bestehen, während die hier besprochenen Geschwülste zur Klasse der falschen Neurome gehören oder vielleicht besser als Neuromyxofibrome zu bezeichnen sind. Übrigens kommen hier meist die medullären oder die fibrösen Formen zur Entwicklung.

Über das Auftreten von Myxofibromen im Herzen, die vom subendokardialen Bindegewebe ausgehend als gestielte, zum Teil traubenartig zusammengesetzte Geschwülste in die Herzhöhle sich vorbuchten, haben Virchow, Czapek, Jürgens, Berthenson, Robin, Marchand, Pawlowsky, Jacobsthal berichtet. Auffällig ist, daß die Neubildung stets im linken Vorhof, meist in der Nähe des Mitralostium ihren Sitz hatte. Jedenfalls gehört das endokardiale Herzmyxofibrom zu den embryonal angelegten Schleimgeschwülsten. In den Fällen von Virchow, Robin und Marchand führte die Loslösung von Geschwulstteilen zu embolischem Verschuß von Hirngefäßen. Im Falle Pawlowsky rief der Tumor die klinischen Erscheinungen von Mitralstenose hervor.

Unter den Schleimhäuten wird am häufigsten die Mucosa der Nase Sitz von Schleimgewebswucherungen, welche, vom Gewebe der Nasenschleimhaut ausgehend, sich in die Nasenhöhle als gestielte Polypen, Schleimpolypen, vorbuchten. Diese Myxofibrome der Nasenhöhle sind in den Arbeiten von Hopmann und Seifert eingehend beschrieben.

Auch ist ein Myxofibrom des Kehlkopfes beschrieben. Ich möchte nun diesen interessanten Fall der Literatur anführen, der, wenn er auch nicht unbedingt hierher gehört, doch bemerkenswert ist.

Langenbeck berichtet:

Eine 50jährige, abgemagerte Patientin zeigt als Grund ihrer beinahe zweijährigen Schling- und Atembeschwerden beim Herunterdrücken der Zunge mit dem Spatel an der Epiglottis eine unebene, taubeneigroße, graurötliche Geschwulst, deren Ursprung nicht abzutasten ist. Die vordere Halsgegend erwies sich verlängert, die

Gewebe über dem Larynx hart und infiltriert, so daß die Tracheotomie erschwert ist. 5 cm langer Schnitt, Lig. hyothy. med. fast ganz geschwunden. Der in den Pharynx eingeführte Finger eines Assistenten drängt den Tumor vor, nach Eröffnung der Schleimhaut zeigt sich derselbe vom linken Lig. aryepiglott. entspringend und bis zur linken Gießkanne verwachsen, da bei der sorgfältigen Abpräparierung starke Blutung entsteht, schiebt L a n g e n b e c k einen Badeschwamm in den Pharynx, der die Rima glottidis vollkommen verdeckt. Am 23. Tage wurde die Kanüle entfernt, bis dahin die Ernährung mittelst der Schlundsonde ausgeführt. Der Tumor war ein Fibromyxom.

Ein Myxofibrom der Uterus Schleimhaut wurde von L a n c e r e a u x beobachtet.

Von drüsigen Organen ist das Vorkommen des Myxofibroms am Hoden als eine Form der Sarkocele zu erwähnen. W a l d e y e r beschrieb ein arborescierendes Myxofibrom des Samenstranges. Außerdem finden sich in der Regel reichliche myxomatöse Wucherungen in den vom Hoden ausgehenden Mischgeschwülsten.

Die als Ovarialmyxofibrome beschriebenen Geschwülste sind als mit myxomatöser Umwandlung des Bindegewebes der Cystenwandungen aufzufassen.

Besondere Erwähnung verdienen noch die Myxofibrome der weiblichen Brustdrüsen, welche allerdings zuweilen auch in der Form der Myxoma lipomatodes auftreten. Die Entwicklung geht aus dem interstitiellen Gewebe, welches die Milchgänge und die Endbläschen umgibt, hervor; indem die Schleimgewebswucherung in die Milchanäle hineingelangt, dehnt sie dieselben aus und erfüllt sie mit der Neubildung, welche in solchen Fällen eine blättrige oder papillöse Form hat. Die Drüse zeigt dann auf dem Durchschnitt einen eigentümlich blättrigen Bau, den Virchow mit einem durchschnittenen Kohlkopf verglichen hat. Es ist übrigens zu berücksichtigen, daß auch hier Kombinationen von Myxom und Sarkom vorkommen. Kommt es, was bei rasch wachsenden, stark vascularisierten Myxofibromen sich ereignen kann, zum Durchbruch nach außen und zur

Verjauchung, so macht die Geschwulst leicht den Eindruck einer bösartigen fungösen Neubildung.

Auch ist zu erwähnen hinsichtlich des Vorkommens des Myxofibroms, daß dasselbe in seltenen Fällen in der Lunge (Virchow) und in der Leber (Cornil und Cazalis) gefunden wurde.

In der Niere tritt geschwulstförmige Schleimgewebswucherung vorwiegend in Mischgeschwülsten auf. Von Myxofibromentwicklung aus der Nierenkapsel liegen vereinzelt Beobachtungen vor. So berichtet Groß von einem Myxofibrom der Nierenkapsel.

„Bei einer 46jährigen Frau, welche vor drei Monaten eine Geschwulst im linken Oberbauch bemerkt hatte, fand sich am oberen Pol der Niere, mit diesem durch derbe Adhäsionsstränge verbunden, ein kindskopfgroßer Tumor, welcher sich histologisch als Myxofibrom erwies. Er hatte die Niere nach unten verdrängt, das Nierenbecken deformiert und zu Erweiterung und Knickung des Ureters geführt.

Mit Vorliebe sitzen die Myxofibrome am Oberschenkel, wo sie von der Haut und Unterhaut, vom Zwischenmuskelgewebe, von den Fascien und Schleimbeuteln am Kniegelenk ausgehen, seltener an den Armen und in der Glutäalgegend. Ferner wurden die Myxofibrome an den großen Schamlippen, endlich am Hals, der Wange und Unterlippe beobachtet. Auch sind hier die Schleimgewebsgeschwülste im Fettgewebe der Augenhöhle zu erwähnen. Diese Geschwülste können bedeutende Größe erreichen, es wurden solche vom Umfang eines Kindskopfes gefunden.

Nach seinem klinischen Verhalten muß man das Myxofibrom als eine gutartige Geschwulst bezeichnen. Wenn gewisse Myxofibrome, namentlich diejenigen des Nervenapparates, eine erhebliche Gefahr für den Träger haben müssen, so liegt das ja im Sitz, in der mechanischen Beeinträchtigung wichtiger Organe durch die Neubildung. Freilich kommt gerade an den Nerven, wie schon erwähnt wurde, eine multiple Entwicklung der Myxofibrome vor, doch finden wir auch bei anderen Geschwülsten, die wir zu den gutartigen rechnen, ein solches Auftreten an verschiedenen Stellen eines geweblichen Systems. In Bezug auf das örtliche Verhalten wird

man allerdings zugeben müssen, daß das Myxofibrom doch weniger gutartig ist, als das ihm nahestehende Myxolipom. Schon das oft konstatierte rasche Wachstum der Schleimgeschwülste, welches namentlich bei Zellenreichtum und starker Vaskularisation stattfindet und die damit zusammenhängende Neigung der Geschwulst zur Verjauchung, wenn die Oberfläche erreicht wurde, ist in dieser Richtung zu beachten, außerdem aber die Tatsache, daß die tiefer sitzenden, namentlich die intramuskulären Myxofibrome schwieriger vollständig zu entfernen sind, so daß nach solchen Operationen Rezidive nicht zu den Seltenheiten gehören.

Indessen muß auch erwähnt werden, daß nach den Angaben mancher Autoren Myxofibrome vorkommen, welche nach Art der bösartigsten Geschwülste metastatisch auftreten. So wird ein Fall berichtet, wo ein Myxofibrom wiederholt rezidierte und schließlich Metastasen in den Leistendrüsen, der Leber und dem Brustbein hervorrief. Gerade bei der weichen Konsistenz und dem zuweilen konstatierten Gefäßreichtum und raschem Wachstum des Myxofibroms ist die Möglichkeit gegeben, daß entwicklungsfähige Teile der Neubildung in die Gefäße gelangen und an entfernten Orten embolisch sich festsetzen können. Die embolische Verschleppung aus der Herzwand hervorgegangener Myxofibromteile wurde bereits erwähnt. In dem Falle von Marchand sprach das Verhalten des myxomatösen Embolus für die Annahme fortschreitender Entwicklung desselben in dem verstopften Hirnarterienast. Jedenfalls gehört die embolische Verschleppung mit Entwicklung sekundärer Geschwulstknoten beim Myxofibrom zu den größten Seltenheiten. Je rascher die Geschwulst wächst, je zellenreicher sie ist, desto eher wird eine derartige Metastase möglich sein, besonders wenn der Sitz der Geschwulst, wie in den angeführten Fällen einem Strombett des Blutes nahe liegt. Im allgemeinen sind nach der Art ihres örtlichen Wachstums die embryonalen Myxome ungünstiger als die myxoid metamorphosierten Fibrome. Namentlich für die ersteren liegt auch die Möglichkeit eines Überganges in das Sarkom sehr nahe; ja man muß zugeben, daß es keine scharfe Grenzlinie zwischen rasch wachsenden Myxomen und Myxofarkomen gibt; nur zeigen die letzteren

in der Regel neben dem zellreichen Schleimgewebe noch andere Typen der farkomatösen Neubildung.

Das Auftreten der Rezidive ist klinisch bedeutungsvoll. In den Rezidiven pflegt der myxomatöse Charakter meist weniger ausgeprägt zu sein. Entsprechend der lebhafteren Wucherung ist die Zahl der Zellen durchschnittlich größer. Doch finden sich auch nach mehrmaliger Rezidivierung noch ausgesprochene schleimige Partien. Unter dem Mikroskop nehmen in häufig wiederkehrenden Myxomen die Unregelmäßigkeiten der Zellform und sonstige kleinere Abnormitäten zu. Ribbert fand in einem solchen Rezidiv in den schleimigen Abschnitten die Zellen zum Teil außerordentlich groß, aber so mit Vakuolen durchsetzt, daß sie eine rein wabige Struktur zeigten. Dabei war der Kern oft einfach. Es handelte sich also nicht eigentlich um Riesenzellen, die aber auch zugegen waren, sondern um schleimige Aufquellungen des Protoplasmas.



Nun möchte ich meine Fälle anschließen. Im ersten Falle handelt es sich um eine 30jährige Patientin.

A n a m n e s e :

Der Vater der Patientin ist mit 64 Jahren an Rückenmarksleiden, die Mutter mit 62 Jahren an einer Lungenkrankheit gestorben. Patientin hat 3 lebende gesunde Geschwister, 5 weitere starben als Kinder. Sie selbst ist ein 7-Monatskind. Mit 4 Jahren ist sie zuerst gelaufen, soll immer sehr geweckt, aber still und zurückgezogen gewesen sein. Mit 8 Jahren erster Schulbesuch, sie hat angeblich gut gelernt.

An Kinderkrankheiten hat Patientin mit 5 Jahren Typhus gehabt. Körperlich war sie nicht leistungsfähig. Mit 15 Jahren ist sie auf das linke Knie gefallen, das stark geschwollen war und angeblich auseinander gewesen sein soll. Punktion des Knies wurde gemacht. 5 Jahre später Operation einer Lymphzyste. 4 Jahre hier-nach ebenfalls Operation oberhalb des Knies wegen einer Zyste mit blutigem Inhalt. Starke Gewichtsabnahme zu der Zeit. In demselben Jahre fand sich bereits in der Leiste wiederum ein kleiner Knoten, der wegen der allgemeinen Schwäche der Patientin be-lassen wurde. Seit 3 Jahren später haben wir ein Dickerwerden des Knotens. Patientin konnte schlecht gehen, sie hatte angeblich keine Schmerzen. Da sie stets ängstlich war, wurde der Tumor am linken Oberschenkel erst jetzt von den Angehörigen bemerkt.

B e f u n d :

Kleine Patientin, die einen imbecilen Eindruck macht. Sie lacht viel, redet wenig und gibt auf Befragen kaum Antwort. Mehrere Narben am linken Oberschenkel, längs- und quergefellt. In der linken Leiste ein über kindskopfgroßer Tumor, hart, derb, über dem die Haut verschieblich ist, der aber selbst auf der Unterlage fest sitzt. Das Bein im ganzen verdickt. Keine Oedeme. An einzelnen Stellen Oberhaut weit, hängt wie Lappen. Am 29. 3. 33 wurde nun eine Operation durchgeführt.

Pantopon-Mischnarkose. Zunächst Längs-, dann Querschnitt in ganzer Ausdehnung des Tumors. Durchtrennung von Haut, Unterhautfettgewebe, dann kommt man nach Durchtrennung mehrerer Schichten straffen, festen Gewebes auf den eigentlichen Tumor, der

eine feste kräftige Kapfel hat und etwas ödematös durchtränkt ist. An der lateralen Seite des Tumors, diesem eng anliegend, verläuft die Vena saphena, danach muß also die Gefäßscheide lateral vom Tumor liegen. Seinen Ausgangspunkt hat der Tumor augenscheinlich von oben und zwar vom horizontalen Schambeinaft. Er sitzt oben am Beckenknochen so fest, daß hier knöcherne Teile beim stumpfen Loslösen mit entfernt werden; höchstwahrscheinlich ist darum der Tumor periostaler Art. Auffallend sind die dicken schwartigen ödematös durchtränkten Hüllen, die fast aussehen wie ein großer Bruchfack. Nach stumpfem Ablösen ist man mitten in der Adduktorenmuskulatur. Der Nervus obturatorius und die Gefäße liegen in weiter Ausdehnung frei. Es müssen mehrere kleine Blutungen, die von der Vena obturatoria ausgehen, unterbunden werden. Danach gibt es aber reine Bahn. Der Tumor ist fast kreisrund, absolut solide und derb, sieht am ähnlichsten einem Myxom. Nach Auslösung des Tumors wird die dicke, schwartige Kapfel noch entfernt. Dabei wird die Art. profunda fem. verletzt; sie muß unterbunden werden, außerdem eine Reihe beträchtlicher Venen im Gebiet der Vena saphena und der Abgangsäste der Vena femoralis. Die Vena fem. ist außerordentlich stark erweitert. Dann liegt die große Wundhöhle frei, die vorzugsweise das ganze Gebiet medial von den großen Gefäßen umfaßt. Im lateralen Randgebiet liegen zunächst die stark erweiterte Vena femoralis, lateral davon pulsiert die Art. femoralis. Im medialen Wundgebiet liegen der Pectineus und die Adduktoren. Überall ist klare anatomische Übersicht. Unterbindung einer Reihe Gefäßstümpfe, sodaß zum Schluß das Wundgebiet vollkommen trocken ist. Einige subcutane Nähte, namentlich um die Wundhöhle unter dem horizontalen Schambeinaft auszufüllen. Vollkommener Hautverschluß.

Nach der Operation:

Zunächst gibt man Tropfklysma. Patientin verhält sich sehr ruhig. Der eingelegte Katheter funktioniert tadellos.

2. 4.: Patientin hat bereits Stuhl. Katheter wird weggenommen.

Erster großer Verbandwechsel. Urin: o. B.

5. 4.: Die mikroskopische Untersuchung des Tumors ergab Myxofibrom.

Die Wunde scheint sich vollkommen p. pr. zu schließen, bis auf eine kleine Stelle am Kreuzungspunkt der Schnitte.

8. 4.: Patientin hat auf dem ganzen Körper, besonders am Bauch länglich runde rötliche Flecken mit gezacktem, leicht erhabenem Rand, die aber keineswegs jucken oder schmerzen. Sie erhält Kalzan. Angeblich hat sie auch zu Hause des öfteren solche Flecken, die von selbst verschwinden, gehabt. Die Wunde wird mit Mastisolverbänden versehen.
20. 4.: Verhaltung: Große, hart infiltrierte rote Stelle am linken Oberschenkel. An einigen Stellen wird die Wunde geöffnet. Danach Wärme. Nach einigen Tagen setzt starke Sekretion ein. Absolute Bettruhe.
1. 5.: Die Entzündung und Infiltration sind soweit zurückgegangen. Die Sekretion läßt nach. Patientin hat bis jetzt keine Schmerzen gehabt. Die roten Flecken sind weg.
10. 5.: Patientin geht zum einweisenden Arzt gebessert, nicht arbeitsfähig zurück. An zwei Stellen etwa 2 cm lange, frisch granulierende, oberflächliche Wunde.

Patientin wird also am 10. 5. 1933 entlassen, am 1. 4. 1935 findet Wiederaufnahme statt. Seit mehreren Monaten bemerkte Patientin wieder eine Anschwellung des linken Oberschenkels, die rapide zugenommen habe.

B e f u n d :

An der Innenseite des linken Oberschenkels befindet sich ein nicht druckempfindlicher, von der Inguinalgegend bis unter das Knie reichender Tumor, von weicher, zum Teil schwammiger Konsistenz. Er ist auf der Unterlage verschieblich, ebenso gegenüber der Haut.

O p e r a t i o n a m 2. 4. 1935:

In Mischnarkose Längsschnitt an der Innenseite des linken Oberschenkels vom Knie aufwärts bis in die Schenkelbeuge, also in

ganzer Länge des Oberschenkels. Nach Abpräparierung der Haut gelangt man zunächst in eine Partie von subcutanem Fett, das mehrere Finger breit dick ist. Diese Fettschicht wird zunächst freigelegt und dann herauspräpariert. Der weit nach oben hin, etwas unterhalb der Fossa ovalis gelegene harte Knoten ist ein gut taubeneigroßer Tumor, der dem früheren Tumor absolut gleicht und deswegen als Rezidiv angesprochen werden muß. Er liegt an der Gefäßscheide derart fest, daß er von der Art. femoralis sorgfältig abpräpariert werden muß. Der übrige Teil der enormen Geschwulst besteht aus lauter Fett, das aber mit dem übrigen Gewebe, wie beispielsweise der Muskulatur, besonders des Sartorius ungewöhnlich feste Verbindungen eingegangen ist. Sie ist außerdem sehr derb, schleimartig, ödematös durchtränkt. Diese ganze schleimig fettig entartete Partie an der Innenseite des Oberschenkels hält sich vorwiegend im Verlauf der Gefäßscheide und ist augenscheinlich sehr mit der Muskulatur verknüpft, die auch an sich ihre intensiv rote Farbe verloren hat und einen blassen degenerierten Eindruck macht. Die eigenartige Schleimgeschwulst ist überall hereingewachsen in die Muskulatur, infiltrativ, sonst auch expansiv durch Verdrängung benachbarter Weichteile. An der Innenseite des Kniegelenkes ist eine über faustgroße, mit braunrotem Blut und Fibringerinnfeln ausgefüllte Höhle mit fingerdicker Wand, die das gleiche Aussehen hat, wie der übrige Teil der Geschwulst. Auffallend ist auch, daß die Gelenkkapsel an der Geschwulstbildung beteiligt ist, die große divertikelartige Ausstülpungen und Ausbuchtungen gemacht hat. Nachdem große Mengen dieses eigenartigen myxomatösen Gewebes aus der Cutis, der Gelenkkapsel, der Muskulatur der Gefäßscheide herauspräpariert und entfernt worden sind, werden mehrere große Hautlappen excidiert, um dem Äußeren des Beines wieder etwas Form zu geben. Zunächst wird an der Innenseite des Oberschenkels ein langer Streifen bis handbreit herausgeschnitten, dann ein querer vor dem Kniegelenk und ebenso auch ein querer nach der Kniekehle zu. Sämtliche Wunden werden primär durch Naht geschlossen ohne jede Drainage. Fester Kompressionsverband, Lagerung auf T-Schiene.

Nach Beendigung der Operation hat Patientin einen guten Puls, sieht auch gut aus. Während der Operation trat einmal eine etwas stärkere Zyanose auf, die aber rasch wieder verschwand. Sie wurde dann mit dem Wagen von einer Schwester heraufgefahren. Kurze Zeit darauf wurde telephonierte, es solle gleich einer von den Ärzten heraufkommen, da Patientin schlecht atme. Ein Arzt ist dann sofort mit dem Aufzug heraufgefahren. Patientin lag im Bett. Zwei Schwestern bei ihr, eine machte künstliche Atmung. Patientin war aber augenscheinlich schon tot. Es war kein Puls zu fühlen, auch nicht an der Carotis. Die Pupillen waren weit, keinerlei Atmung. Sie wurde dann wieder auf den Wagen gelegt in höchster Eile, um sie flach hinzulegen und ausgiebig künstliche Atmung machen zu können. Nach kurzer Zeit hörte man auch wieder einzelne Herztöne, etwa ein halbes Dutzend in unregelmäßiger Stärke. Auch die Pupillen schienen etwas kleiner zu werden. Es wurde die künstliche Atmung dann noch fast eine halbe Stunde fortgeführt, leider ohne Erfolg.

Es wäre nicht ausgeschlossen, daß eine Embolie eingetreten ist.

Die Untersuchung vom pathologischen Institut der Universität Berlin vom 4. 4. 1933 gab folgenden Befund:

„Das überlancete Stück aus dem Tumor der linken Leisten-
gegend erweist sich histologisch als myxofibromatöses Ge-
webe. Da nur sehr vereinzelt Mitosen beobachtet werden
können, ist die Geschwulst mit großer Wahrscheinlichkeit
gutartig; es läßt sich jedoch genaueres über die Wertigkeit
nicht ausagen, da $\frac{9}{10}$ des Gewebes nekrotisch und nur in
der Umgebung kleinerer Gefäße erhaltene Geschwulstpartien
sichtbar sind.

Diagnose: Wahrscheinlich Myxofibrom.“

Im zweiten Falle meiner Arbeit handelt es sich um einen 58jährigen Patienten.

Anamnese:

Der Vater des Patienten starb mit 84 Jahren. Die Mutter hat Patient kaum gekannt. Ein Bruder ist gestorben, vier übrige sind gesund.

Die Frau und 4 Kinder des Patienten sind gesund. Eine Tochter starb an Tuberkulose, eine andere an Rippenfellentzündung.

Patient ist nie ernstlich krank gewesen. Vor etwa 30 Jahren erlitt er durch einen Glasplitter eine Verletzung seines rechten Auges. Im Kriege verlor er rechts das Gehör. Anfang des Jahres 1935 bemerkte Patient, daß er eine Schwellung an der Innenseite des linken Oberschenkels hatte, etwa von der Größe und Dicke einer Hand. Schmerzen oder irgendwelche Beschwerden hat er nicht davon gehabt. Er zeigte diese Schwellung dem Arzte, der zufällig im Hause war. Dieser habe ihm gesagt, er möge darauf achten, ob die Geschwulst sich vergrößere und hat ihn gleichzeitig auch an den Chirurgen verwiesen, der ihm die Operation anriet.

Befund:

Kräftig gebauter, unteretzter Mann. In der rechten Leiste über kindskopfgrößer, praller Tumor, der sich nur wenig verschieben läßt. Er liegt in der Gegend der Gefäßscheide. Ein Oedem der Umgebung oder des Beines besteht nicht. Der Bauch ist frei. Herz und Lunge sind, soweit festzustellen, ohne pathologischen Befund. Urin: o. B.

Besondere Beschwerden macht der Tumor nicht. Weil er größer geworden ist, will der Patient ihn entfernen lassen.

Operation am 11. 3. 35:

Unter Lumbalanästhesie, die vollkommen ist, wird Längsschnitt über der Höhe der Geschwulst gemacht, nach oben hin bis über das Poupart'sche Band hinaus, nach abwärts bis etwa zur Mitte des Oberschenkels. Es wird dann Schritt für Schritt weiter gegangen, bis man auf die Gefäßscheide kommt. Die Arterie liegt im größten Teil des Schnittbereiches vor, die Vene liegt im Fett und ist nicht zu sehen, wird auch weiter nicht herauspräpariert. Dann wird auf die Tumorkapsel eingedrungen, nachdem eine Reihe Unterbindungen angelegt sind. Der Tumor hat sich in dem Raum zwischen Poupart'schem Band nach oben lateral und Musc. pectineus nach innen entwickelt, also etwa im Scapa'schen Dreieck. Der Tumor erstreckt sich aber ungeheuer weit nach der Rückseite

des Oberschenkels. Man könnte fast zu der Auffassung kommen, daß er von der Scheide des Nervus ischiadicus ausgegangen wäre. Sein Hauptanteil liegt nach innen und hinten vom Femur. Er läßt sich aber überall fast stumpf auslösen. Einzelne fest haftende Stränge, die zur Kapsel hinziehen, werden gefaßt und unterbunden; nirgendwo eine stärkere Blutung. Der Tumor fast kindskopfgroß, ist unregelmäßig gelappt, schmutzig gelb an der Oberfläche. Nach vollkommener Entfernung fühlt man den Trochanter minor, von dessen Perioft er ausgegangen sein könnte. Er ist zwei Pfund schwer (frisch gewogen). Nach Unterbindung aller Gefäße wird die Fascia lata genäht, dann die Hautwunde vollkommen durch Klammern oder Naht verschlossen.

Nach der Operation:

18. 3. 35: Befondere Beschwerden bestehen nicht. An der Unterseite des linken Unterschenkels leichtes Oedem, Haematom mit starker Verfärbung der Haut und fast des ganzen Oberschenkels. Beim Verbandwechsel ist die Wunde p. pr. geheilt. Bei der Entfernung der Fäden entleert sich aus den Stichkanälen altes Blut. Die ganze Umgebung der Narbe ist geschwollen, prall. Es besteht anscheinend ein starkes Haematom des ganzen Wundbettes. Deswegen weiterhin Bettruhe.

21. 3.: Verbandwechsel, weiterhin Bettruhe.

27. 3.: Patient geht gegen Revers nach Hause.

Das Haematom hat sich etwas verkleinert, zu einer stärkeren Entleerung nach außen hin ist es nicht gekommen. Eine weitere Untersuchung des Abdomens und der Lunge kann nicht erfolgen, da Patient das Krankenhaus sofort verläßt. Es besteht noch ein leichtes Oedem des Oberschenkels. Befondere Beschwerden hat Patient beim Gehen nicht.

Die Untersuchung vom pathologischen Institut der Universität Berlin vom 18. 3. und 2. 4. 1935 gaben folgenden Befund:

18. 3.:

„Das überfandte Stück aus dem Tumor der linken Schenkelbeuge bestand makroskopisch aus einem schwammigen Gewebe, das zentral eine Nekrose zeigte. Kapsel glatt, erscheint intakt. Im histologischen Schnitt besteht das Tumorgewebe aus überaus locker angeordneten Zellelementen mit reichlichen vakuoligen Zwischenräumen, in denen sich leicht bläulich anfärbende homogene Massen befinden. Die Zellen selbst zeigen die mannigfachen Größen und Formen, von der kleinen Rundzelle bis zur mehrkernigen Riesenzelle. Letztere besonders sind sehr chromatinreich. Der Plasmaleib zeigt vielfach sternförmige Verästelung und bildet in starkem Ausmaß kollagene Fasern, die durch die oben erwähnte Grundsubstanz auseinandergesprengt und aufgefasert erscheinen. Herdförmig im Schnitt liegen Ansammlungen von Rundzellen und Plasmazellen. Ein Teil des Tumors ist nekrotisch. Die Gefäße zeigen vielfach eine Aufquellung ihrer Wand mit Homogenisierung ihrer Umgebung.

Diagnose:

Es handelt sich um ein myxomatöses Sarkom, dessen Kernreichtum zwar nicht groß ist, bei dem jedoch die Heterotypie der Kerne und der Chromatinreichtum auf eine starke Wachstumstendenz hinweisen. Die überaus starke Bildung schleimartiger Substanz ist nicht ganz gewöhnlich, spricht jedoch nicht gegen den bösartigen Charakter der Geschwulst.

2. 4.: Ich bin der Meinung, daß trotz der vom Assistenten hervorgerufenen und zum Teil stark atypischen Zellformen, das Myxom zur Zeit der Operation noch gutartig war. Die atypischen Zellformen führe ich auf die starke Selbstvergiftung des Tumors zurück. Entscheidender ist mir, daß der Tumor doch im ganzen sehr zellarm und vor allem sehr gut begrenzt ist. Ich würde also doch gutartiges Myxom und nicht Myxo-Sarkom annehmen.

Im allgemeinen ist zu sagen, daß die Therapie der Myxofibrome darin bestehen muß, sie möglichst sofort chirurgisch anzu-

gehen, wobei auf die radikale Entfernung der Geschwulst größter Wert zu legen ist um einer etwaigen Rezidivierung vorzubeugen.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß die Myxofibrome ganz seltene Geschwülste sind. Jedoch soll man trotz ihrer meist gutartigen Geschwulstform sie nicht unterschätzen, da sie manchmal sehr expansiv wachsen und durch ihre Größe, die sie erreichen können, einerseits oft Ausfallerscheinungen je nach ihrem Sitz herbeiführen können und andererseits natürlich stark hindernd wirken können. Auch wachsen sie oft infiltrierend, so daß sie schwieriger zu entfernen sind und Rezidive nicht zu den Seltenheiten gehören.

Literaturnachweis.

1. Paget: Lect. on surgical path. LL.
2. Müller, J.: Arch. f. Anat. u. Physiol. 1836.
3. Virchow: Arch. 1857, 11.
4. Virchow: Die krankhaften Geschwülste L.
5. Billroth: Beiträge zur patholog. Histologie, Berlin 1858.
6. Langenbeck: Arch. f. klin. Chir. 1.
7. Levrat-Perroton: Sur un cas de Glycosurie. Thèse de Paris. 1859.
8. Volkmann: Virchow's Archiv.
9. Müller, W.: Beobachtungen des pathologischen Institutes zu Jena. 1871.
10. Cornil et Cazalis: Gaz. méd. 1872.
11. Lancereaux: Anat. patholog.
12. Wood, J.: Transact. of the Path. Soc. 1878.
13. Köster: Sitzungsber. d. Niederrhein. Gesellschaft f. Natur- und Heilk. 1881.
14. Hopmann: Monatschr. f. Ohrenheilk. 1885, 6.
15. Seifert: Verhandl. d. physik.-med. Gesellschaft in Würzburg. 1887.
16. Virchow: Charité-Annal. 6.
17. Chevalier: Etude sur le myxome, Paris 1891.
18. Marchand: Über den Bau der Blasenmole. Zeitschr. f. Geburtsh. 22.
19. Orth: Über Schleim und Schleimgeschwülste. Königl. Gesellsch. d. Wissensch. Göttingen 1895.
20. Czapek: Prager med. Wochenschr. 1891.
21. Jürgens: Berliner klin. Wochenschr. 1891.
22. Berthenson: Arch. de méd. expér. et d'Anat. path. 1893.
23. Marchand: Berliner klin. Wochenschr. 1894.
24. Pawlowsky: Berliner klin. Wochenschr. 1895.
25. Kickhefel: Systematische Stellung des schleimigen Gewebes.
26. Lexer: Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie.
27. Lubarsch und Ostertag: Ergebnisse der allg. path. Morphol. u. Phys. 1895.
28. Afchoff: Lehrbuch der allg. und pathologischen Anatomie.
29. Ribbert: Lehrbuch der allg. und pathologischen Anatomie.
30. Schmidt's Jahrbücher der Medizin. 1863.
31. Krogius, A.: Acta chir. scand. 64, 1929 und 1928.
32. Brodowski: Denkwürdigk. d. Gef. d. Wersch. Aerzte, 1867.
33. Hoyer: Nachweis des Mucin, Arch. f. mikrosk. Anat.
34. Weichselbaum: Virchow's Archiv.
35. Virchow: Annal. d. Charité-Krankenh. 8, 2.
36. Schuh: Pseudoplasmen. 1854.

37. Rokitansky: Path. Anat. 1855, 1.
 38. Wagner, E.: Virchow's Archiv. 8.
 39. Billroth: Archiv d. Heilk., 3.
 40. Lebert: Atlas d'Anat. path. Pl.
 41. Weber, C. O.: Chir. Erfahrungen. 1859.
 42. Cornillet Ranvier: Man. d'histol. path., 1.
 43. Coupland: Ibid. 1 u. 2.
 44. Robin: Ibid. 1893.
 45. Jacobsthal: Arch. f. patholog. Anatomie u. Physiologie 159. B.
1900.
-

Lebenslauf.

Ich, Walter Heinen, wurde als Sohn des Kaufmanns Josef Heinen und seiner Ehefrau Maria geb. Nuys am 6. Juni 1909 zu Odenkirchen geboren. Ich bin arischer Abstammung. Zuerst besuchte ich die Elementarschule zu Odenkirchen. Ostern 1929 erhielt ich an der Oberrealschule zu M.Gladbach das Zeugnis der Reife. Nun widmete ich mich dem Apothekerberuf und erledigte in der Odenkirchener Stadtapotheke die Praktikantenzeit. Anschließend legte ich an der Regierung zu Düsseldorf mein pharmazeutisches Vor-examen mit „gut“ ab. Anschließend ging ich zum Medizinstudium über und bezog die Universität in Köln. Im Sommer 1933 bestand ich an der Universität Marburg die ärztliche Vorprüfung mit „sehr gut“ und legte im Herbst 1936/1937 an der Universität Bonn das ärztliche Staatsexamen mit „gut“ ab.

Zum Schlusse ist es mir eine angenehme Pflicht, Herrn Chef-
arzt Dr. Sickmann in M.Gladbach für die Überlassung des
Themas und der beiden Fälle, außerdem Herrn Professor Dr.
Graff für die Übernahme des Referates meinen verbindlichsten
Dank auszusprechen.